

## Áreas de riesgo para las cuales es recomendable colocarse la vacuna de la fiebre amarilla

Las áreas de riesgo determinadas por la OPS/OMS para departamentos, provincias o estados de los países de las Américas, consisten en:

- **Argentina:** Misiones y parte de Corrientes (alto riesgo), áreas cercanas a Bolivia y Paraguay en las provincia de Salta, Jujuy, Formosa y Chaco (bajo riesgo).
- **Bolivia:** Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Potosí, Santa Cruz, Tarija.
- **Brasil:** La vacunación se recomienda actualmente a las personas que se dirijan a los Estados de Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal (incluyendo a la capital Brasilia), Espírito Santo, Goiás, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins. La vacunación se recomienda igualmente a los viajeros que visitan las cataratas de Iguazú. Las **nuevas áreas de recomendación de vacunación** se mantendrán temporalmente, e incluyen las siguientes regiones: todo el territorio de los estados de Espírito Santo, de Río de Janeiro (incluida la ciudad de Rio de Janeiro), de San Pablo (incluida la ciudad de San Pablo) y gran parte del estado de Bahía, incluyendo las ciudades de Salvador de Bahía y Praia do Forte.

La **vacuna NO está indicada** para quienes viajan a la zona costera del estado de Santa Catarina (incluyendo Florianópolis y balnearios vecinos) ni del estado de Paraná (incluyendo Curitiba). Tampoco se recomienda para gran parte del nordeste de Brasil (incluyendo los estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará y zona centro y Norte de Piauí) o para cualquier otra región que no esté mencionada anteriormente ni incluida en las áreas en que figuran amarillo y rojo en el siguiente mapa.



**Vaccine recommended**

- Vaccine recommended
- Vaccine recommended due to current outbreak
- Vaccine not recommended

**São Paulo City Note:** Vaccination is not recommended for travel that is limited to the urban areas of São Paulo City. Because the edge of urban areas can be difficult to map, infection risk in the outskirts of the city may be difficult to determine. The decision to vaccinate should also consider duration of travel, and the possibility of travel outside São Paulo

Fuente: [cdc.gov/travel/news-announcements/yellow-fever-vaccine-brazil](https://cdc.gov/travel/news-announcements/yellow-fever-vaccine-brazil)

Actualizado al 19 de enero de 2018

- **Colombia:** Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyaca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Córdoba, Cundinamarca, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Narino, Norte De Santander, Putumayo, Quindio, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle Del Cauca, Vaupes, Vichada (alto riesgo).
- **Ecuador:** Azuay, Bolívar, Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabi, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsachilas, Sucumbios, Tungurahua, Zamora Chinchipe, Zona no delimitada (antes Canar), Zona no delimitada (antes Imbabura), Zona no delimitada (antes Manabi).
- **Guyana francesa:** Cayenne y Saint Lorent du Maroni.
- **Guyana:** Barima/Waini (Región n°1), Cuyuni/Mazaruni (Región n°7), Demerara/Mahaica (Región n°4), East Berbice/Corentyne (Región n°6), Essequibo Islands/West Demerara (Región n°3), Mahaica Berbice (Región n°5), Pomeroon/Supenaam (Región n°2), Potaro/Siparuni (Región n°8), Upper Demerara/Berbice (Región n°10), Upper Takutu/Upper Essequibo (Región n°9).
- **Panamá:** Darien, Emberá, Kuna Yala, Panamá.
- **Paraguay:** Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Asunción, Boqueron, Caaguazú, Caazapa, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guaira, Itapúa, Misiones, Neembucu, Paraguari, Presidente Hayes, San Pedro.
- **Perú:** Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de dios, Pasco, Piura, Puno; San Martín, Tumbes, Ucayali.
- **Suriname:** Brokopondo, Commewijne, Coronie, Marowijne, Nickerie, Para, Paramaribo, Saramacca, Sipaliwini, Wanica.
- **Trinidad y Tobago:** Arima, Chaguanas, Couva/Tabaquite/Talparo, Diego Martín, Penal/Debe, Point Fortin, Port of Spain, Princes Town, Rio Claro/Mayaro, San Fernando, San Juan/Laventille, Sangre Grande, Siparia, Tunapuna/Piarco.
- **Venezuela:** Amazonas, Anzoategui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Federal, Guarico, Merida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Tachira, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia.

Para mayor detalle y clasificación de riesgo, observar el mapa de las áreas determinadas por las OPS/OMS y los estados miembros, en este [enlace](#) (las zonas pueden verse coloreadas de acuerdo al riesgo al hacer *zoom* en cada una).

El sudeste asiático y África también son zonas de riesgo para la transmisión de la fiebre amarilla, por lo que también se recomienda la vacunación contra esta enfermedad.